

Solución a posibles complicaciones

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Lesiones en la nariz	<ul style="list-style-type: none"> ● Irritación debida a la rigidez de la sonda 	<ul style="list-style-type: none"> ● Movilizar la sonda y cambiar el punto de fijación periódicamente ● Aplicar una solución desinfectante o lavar la zona con agua jabonosa ● Cambiar la tirita o esparadrapo cada día ● En caso de lesión importante cambiar la sonda de orificio de la nariz
Obstrucción de la sonda	<ul style="list-style-type: none"> ● La fórmula nutricional o los medicamentos se han secado en el interior de la sonda 	<ul style="list-style-type: none"> ● No introduzca objetos por la sonda ● Pase agua templada (50ml) con la ayuda de una jeringa ● Si la obstrucción persiste consulte a su especialista de referencia
Salida de la sonda nasogástrica	<ul style="list-style-type: none"> ● La sonda se desplaza hacia el exterior por causa accidental, por una maniobra inadecuada 	<ul style="list-style-type: none"> ● No se asuste y consulte a su especialista de referencia en cuanto se dé cuenta del arrancamiento
Tos irritativa	<ul style="list-style-type: none"> ● Posible salida parcial de la sonda nasogástrica 	<ul style="list-style-type: none"> ● Comprobar que la sonda está fijada según la marca establecida al colocarla la primera vez
Náuseas y vómitos	<ul style="list-style-type: none"> ● Posición incorrecta del paciente ● La fórmula de nutrición enteral pasa demasiado rápido ● Causas debidas a la dieta y/o medicación 	<ul style="list-style-type: none"> ● Coloque al niño en la posición correcta incorporándolo 30-45° ● Detenga la nutrición de 1 a 2 horas. Reinicie la nutrición transcurrido este tiempo, y si las náuseas o vómitos persisten, detenga la nutrición ● Revise las pautas de administración de la alimentación y de la administración de medicamentos ● Si persisten cualquiera de los problemas antes mencionados, consulte a su especialista de referencia
Diarrea	<ul style="list-style-type: none"> ● La fórmula nutricional pasa demasiado rápido ● La fórmula nutricional está demasiado fría ● Medicación 	<ul style="list-style-type: none"> ● Detenga la nutrición de 1 a 2 horas. Reinicie la nutrición transcurrido este tiempo y si persiste la diarrea, consulte a su especialista de referencia ● Administre la fórmula nutricional a temperatura ambiente ● Consulte a su especialista de referencia
Estreñimiento	<ul style="list-style-type: none"> ● Inmovilidad ● Falta de hidratación 	<ul style="list-style-type: none"> ● Si es posible, pasear un poco ● Siga las normas de hidratación adecuadas ● Si persiste el estreñimiento, consulte a su especialista de referencia
Aspiración	<ul style="list-style-type: none"> ● Colocación de la sonda 	<ul style="list-style-type: none"> ● Modificar la colocación de la sonda ● Comprobar la colocación del niño cuando se administra la nutrición