Solución a posibles complicaciones

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Lesiones en la nariz	 Irritación debida a la rigidez de la sonda 	 Movilizar la sonda y cambiar el punto de fijación periódicamente Aplicar una solución desinfectante o lavar la zona con agua jabonosa Cambiar la tirita o esparadrapo cada día En caso de lesión importante cambiar la sonda de orificio de la nariz
Obstrucción de la sonda	 La fórmula nutricional o los medicamentos se han secado en el interior de la sonda 	 No introduzca objetos por la sonda Pase agua templada (50ml) con la ayuda de una jeringa Si la obstrucción persiste consulte a su especialista de referencia
Salida de la sonda nasogástrica	 La sonda se desplaza hacia el exterior por causa accidental, por una maniobra inadecuada 	No se asuste y consulte a su especialista de referencia en cuanto se dé cuenta del arrancamiento
Tos irritativa	 Posible salida parcial de la sonda nasogástrica 	Comprobar que la sonda está fijada según la marca establecida al colocarla la primera vez
Náuseas y vómitos	 Posición incorrecta del paciente La fórmula de nutrición enteral pasa demasiado rápido Causas debidas a la dieta y/o medicación 	 Coloque al niño en la posición correcta incorporándolo 30-45º Detenga la nutrición de 1 a 2 horas. Reinicie la nutrición transcurrido este tiempo, y si las náuseas o vómitos persisten, detenga la nutrición Revise las pautas de administración de la alimentación y de la administración de medicamentos Si persisten cualquiera de los problemas antes mencionados, consulte a su especialista de referencia
Diarrea	 La fórmula nutricional pasa demasiado rápido La fórmula nutricional está demasiado fría Medicación 	 Detenga la nutrición de 1 a 2 horas. Reinicie la nutrición transcurrido este tiempo y si persiste la diarrea, consulte a su especialista de referencia Administre la fórmula nutricional a temperatura ambiente Consulte a su especialista de referencia
Estreñimiento	InmovilidadFalta de hidratación	 Si es posible, pasear un poco Siga las normas de hidratación adecuadas Si persiste el estreñimiento, consulte a su especialista de referencia
Aspiración	Colocación de la sonda	 Modificar la colocación de la sonda Comprobar la colocación del niño cuando se administra la nutrición